

セロシア コンフォート カルミナレッド

栽培期間

挿し木～出荷 7~10 週(栽培時期、鉢サイズによる)
プラグが出来上がるまでは、挿し木から約 14 日。

温度

夜温 18℃ 昼温 25℃
夜温は低すぎると徒長の原因となる。夜温を 20℃以上に保つことによりわい化効果が得られる。

短日処理

セロシアは短日植物なので、短日処理が必要。
カルミナレッドでは 11 時間日長を 6 週処理することにより開花がより促進される。

用土

pH 5.8～6.2 EC 1.5～2.0

ピンチ

プラグステージでまず 1 回、3 節目でピンチ。通常 1 回で十分であるが、栽培環境、栽培時期、鉢サイズで調整する。

肥料

カリと窒素の割合が 1 対 2 のバランスのよい肥料を N 濃度 1.5 から 2.0 で適時施す。

害虫

あまり害虫はつかないが、スリップス、アブラムシ用の農薬を予防的に散布することをお勧めする。

注意点

- 同品種を生産するにあたって、ここで示されている栽培情報は基本的な参考資料としてご利用ください。生産された植物は、気候条件や地理的な緯・経度、また作型の時期、ハウスの環境によって結果が異なることがあります
- 殺虫・殺菌剤、また矮化剤の使用についての記載はあくまでもガイドラインであり、必ず使用方法を十分にまた正しく読み、使用者の自らの責任のもとでそれに則った正しい使用方法とるようにしましょう。
- EC 値(電気伝導度)は、ピート主体の北米の用土を算出の基準としているので、土を用いた配合では適合し得ない場合もあります